

Rétablissement de la migration piscicole
**Installations hydroélectriques à assainir
 et qualité des habitats piscicoles**
 Bassin versant de la Venoge

Classes de valeurs d'habitats (Objectifs habitats OFEV)
(Tab. 5 - ch. 4 du rapport)

- Le rétablissement du continuum longitudinal est nécessaire à la conservation de la faune piscicole. Il s'agit d'habitats revêtant une importance cantonale, voire fédérale.
- Le rétablissement du continuum longitudinal est nécessaire à la conservation de la faune piscicole. Il s'agit d'habitats revêtant une importance régionale.
- Le rétablissement du continuum longitudinal peut contribuer à la conservation de la faune piscicole. Il s'agit d'habitats revêtant une importance locale.

Obstacles (> 0.2 m / rayon de 1'000 mètres)

● Naturel ○ 0.2 < h < 1 mètre 2-501 n° de concession hydroélectrique
 ● Artificiel ○ h > 1 mètre ☑ seuil assaini ⚡ limite de bassin versant

Ecomorphologie

— naturel / semi-naturel — faible
 — peu atteint — moyen
 — très atteint — important
 — non naturel / artificiel — très important
 - - - - - enterré / non visité — inexistant

Réseau hydrographique
 — Frai naturel (truite de rivière/lacustre)

1 : 25'000
 Dessin : dt
 15.04.15



