

B2.2 Hêtraie à séslerie (*Seslerio-Fagetum*)

220

Revue bibliographique

Association

La première description de cette association a été faite dans le Jura par Moor (1952), qui distingue deux sous-associations: le *Seslerio-Fagetum anthericetosum* des versants sud et le *Seslerio-Fagetum hylocomietosum* des versants nord. L'association est reprise sous le même nom par Ellenberg & Klötzli (1972, unité 16) et par les diverses typologies ultérieures. Elle est décrite et illustrée par Steiger (1994, p.118-120).

Dans les cantons de Berne/Fribourg (Burger & al. 1996), la présence de l'association est attestée non seulement dans le Jura, mais aussi sur le Plateau et dans les Alpes. Deux sous-associations sont distinguées: le *Seslerio-Fagetum typicum* (16a) sur calcaire dur, et le *Seslerio-Fagetum caricetosum flacca* (16w) sur calcaire marneux. Ces deux sous-associations figurent également à l'inventaire des groupements forestiers du Jura (Burnand & al. 1998), avec une troisième association reprise de Moor (1952): le *Seslerio-Fagetum hylocomietosum* (16l). Le *Seslerio-Fagetum* figure également dans l'inventaire des groupements du canton de Neuchâtel (Richard 1964, 1965). Il apparaît aussi dans l'inventaire du canton du Valais (Werlen 1994), sous le nom de variante à *Calamagrostis varia* de la hêtraie à *Carex alba* (unité 21.2.C). L'association est absente du canton de Genève, tout entier situé à l'étage submontagnard.

L'association est également recensée en France voisine, sous le nom de hêtraie à séslerie (unité H54) dans le Jura (Rameau & al. 2000), et sous celui de hêtraie-chênaie sèche (unité 7.2), variante à séslerie dans les Préalpes (Joud 2006).

Sous-associations

Certaines sous-associations décrites dans la littérature (voir plus haut) sont probablement représentées dans le canton de Vaud, mais, vu la rareté de cette association et sa faible représentation dans la banque de données, elles n'ont pas été encore identifiées avec suffisamment de certitude.