

B5.8 Saulaie riveraine (*Salicetum albae*)

580

Revue bibliographique

Association

Dans sa synthèse sur les groupements riverains de Suisse, Moor (1958) distingue deux groupements de saulaies le long des rivières du Plateau: le *Salicetum triandro-viminalis*, groupement buissonnant submergé par plus d'un mètre d'eau en période de hautes eaux et, également submergé par les hautes eaux mais de manière moins sévère, le *Salicetum albo-fragilis*, buissonnant à arborescent. Ellenberg & Klötzli (1972) ne retiennent que la deuxième association dans leur panorama des groupements forestiers helvétiques et changent son nom, vu la rareté de *Salix fragilis*, en *Salicetum albae* (unité 43). On trouve une description détaillée de cette association, avec des illustrations, chez Steiger (1994, p.160-163).

Le *Salicetum albae* selon Ellenberg & Klötzli (1972) est recensé dans la typologie des cantons de Berne/Fribourg (Burger & al.1996). Un groupement appelé forêt riveraine à saules figure aussi dans la typologie du canton du Jura (Burnand & al.1998), sous le même numéro de code 43 mais décrit comme un fourré de saule et assimilé au *Salicetum triandro-viminalis*. La présence de l'association est également mentionnée dans le canton du Valais (Werlen 1994), sous le nom de saulaie à ortie et géranium herbe à Robert (unité 28.9), et dans le canton de Genève (Hainard & Werdenberg 1999), sous le nom de saulaie-anaie du bord des eaux. Elle ne figure pas dans la liste des groupements forestiers du canton de Neuchâtel (Richard 1964, 1965).

En France voisine, Rameau & al. (2000) décrivent, sous le nom de saulaie arborée à saule blanc (unité Fa23), un groupement qu'ils assimilent au *Salicetum albae*. Dans les Préalpes, Joud (2006) ramène les saulaies, aussi bien arbustives qu'arborescentes, au rang de variante pionnière des forêts alluviales (unité 1.6).

Sous-associations

Aucune sous-association du *Salicetum albae* n'est décrite à ce jour, que ce soit dans la typologie vaudoise ou celles des régions environnantes.

Dans la typologie vaudoise, le *Salicetum triandro-viminalis* de Moor (1958) est ramené au rang de variante pionnière du *Salicetum albae* (585q).