

B8.7 Pineriaie de tourbière (*Sphagno-Mugetum*) Revue bibliographique

870

Association

Le terme de *Sphagno-Mugetum* a été créé par Kuoch (1954) et appliqué à un groupement décrit depuis longtemps sous divers noms moins appropriés. La pineraie de tourbière est une association qui fait l'unanimité dans sa définition phyto-écologique, mais dont le nom scientifique varie parallèlement à celui du pin à crochets dressé, l'arbre typique de cette association. A côté de *Sphagno-Mugetum* (Kuoch 1954, Richard 1965), on trouve en effet plus souvent, dans la littérature régionale, deux autres noms d'association: *Sphagno-Pinetum montanae* (Ellenberg & Klötzli 1972, Steiger 1994, Frehner & al. 2005) et *Sphagno-Pinetum uncinatae* (Burger & al. 1996, Burnand & al. 1998, Rameau & al. 2000). Comme le nom qui fait dorénavant référence pour le pin à crochets dressé est *Pinus mugo ssp. uncinata* (Aeschimann & Heitz 2005), il paraît toutefois légitime de conserver l'appellation originale de Kuoch. On trouve dans Steiger (1994, p.237-239) une description détaillée et des illustrations de l'association.

Avec le code 71 (selon Ellenberg & Klötzli 1972), la pineraie de tourbière est recensée dans les cantons de Berne et Fribourg (Burger & al.1996) et dans celui du Jura (Burnand & al. 1998). Elle fait aussi partie des typologies du canton de Neuchâtel (Richard 1964, unité 22 et Richard 1965, unité 26) et du canton du Valais (Werlen 1994, unité 15.8).

En France voisine, Joud (2006) la classe comme simple variante des forêts tourbeuses (1.3), alors qu'elle est inventoriée comme association à part entière par Rameau & al (2000, CONT Tb 2.4), Bensettiti & al. (2001, 91DO-3) et Gégout & al. (2008, 44-A3), ces derniers lui donnant le nom inédit de *Vaccinio uliginosi-Pinetum rotundatae*.

Sous-associations

Vu le petit nombre de relevés typiques de cette association dans la banque de données, aucune sous-association n'a été distinguée pour le moment.