



•Violences conjugales et addictions?
•Reflexions d'un clinicien

Dr Nelson Feldman,
Service d'Addictologie
Département de santé mentale et psychiatrie
HUG, Genève,
<http://www.hug-ge.ch/addictologie>

HUG
Hôpitaux Universitaires de Genève

Données récentes et publications

- ▶ Lien établi entre **violences domestiques , troubles psychiques et abus de substances.**
- ▶ Identification de **différentes types de violence**: psychique, physique et sexuelle
- ▶ Haute corrélation entre **être victime** de violence physique et usage problématique d'alcool, drogues, troubles de l'humeur, troubles anxieux.
- ▶ Le facteur dépression est important dans la violence à l'égard des hommes.
- ▶ OMS: Association fréquente à considérer
- ▶ Estimations entre 10 et 75 % selon le pays étudié.
- ▶ Salom C. et al. Substance use and mental health disorders are linked to different forms of intimate partner violence victimisation. *Drug and Alcohol Dependence*, 2015.
- ▶ Feder et al. WHO Guidelines. An evidence based-response to intimate partner violence. *J. Am. Assoc.*, 310,479-480

OMS: définition

- ▶ Violence à l'égard du partenaire: comportement qui provoque un dommage physique, psychique ou sexuel.
- ▶ Dépistage recommandé
- ▶ Association fréquente à considérer avec troubles mentaux, troubles liés à l'usage d'alcool et abus de substances. Haute prévalence
- ▶ Prévalence importante à l'égard des femmes
- ▶ Le facteur dépression important dans la violence à l'égard des hommes.
- ▶ Estimations entre 10 et 75 % selon le pays étudié.
- ▶ Salom C. et al. Substance use and mental health disorders are linked to different forms of intimate partner violence victimisation. *Drug and Alcohol Dependence*, 2015.
- ▶ Feder et al. WHO Guidelines. An evidence based-response to intimate partner violence. *J. Am. Assoc.*, 310,479-480

Femmes/ Hommes

- ▶ Victimes: Plus de littérature chez les femmes.
- ▶ Les facteurs associés à la violence sont différents
- ▶ La dépression chez les hommes est associée à une violence psychologique subie
- ▶ La dépression chez les femmes est associée à la violence physique.
- ▶ Renner et al. The association of intimate partner violence and depressive symptoms. *J.R.Health*, 2014, 30, 50-58

Impulsivité et addictions

- ▶ Substances qui ↑ l'impulsivité:
- ▶ Alcool (désinhibition, euphorie)
- ▶ Stimulants: cocaïne, amphétamines, drogues de synthèse
- ▶ Mélanges de substances psychoactives
- ▶ Abus
- ▶ Dépendances/addictions

Addictions et troubles psychiques

- ▶ Le Double diagnostique
- ▶ Association d'un trouble psychique et des comportements addictifs
- ▶ Prévalence élevée de cette combinaison
- ▶ L'œuf et la poule
- ▶ Association fréquente de dépendance aux substances psychoactives et troubles psychiques
- ▶ Importance du repérage diagnostique et d'instaurer un traitement combiné

Impulsivité et santé Mentale

- ▶ Importance du risque de conduites impulsives dans les phases de décompensation de troubles psychiques:
- ▶ Trouble de la personnalité
- ▶ Emotionnellement labile, type impulsif
- ▶ Troubles de l'humeur: manie, hypomanie
- ▶ Troubles psychiques décompensés et non traités

Violences conjugales chez les patients souffrant de troubles mentaux

- ▶ Les patients souffrant de tr. mentaux sont plus vulnérables et présentent un risque + élevé subir de violences.
- ▶ Risque majeur de précarisation
- ▶ Stigmatisation lié aux troubles psychiques
- ▶ Crainte sur le retrait de garde des enfants

Facteurs de risque d'être victime de violences conjugales

- ▶ Dépression
 - ▶ Antécédents de violences subies pendant l'enfance
 - ▶ Abus d'alcool et drogues
 - ▶ Grossesse
 - ▶ Précarité socio-économique
- ▶ Heize L. et al, Violence by intimate partner, World repport on violence and health; genève,WHO,2002;87-121

Facteurs associés

- ▶ Etude sur 6.700 femmes mères pendant 20 ans à Queensland
- ▶ Liens trouvés entre troubles mentaux, abus de substances et différents formes de violence domestique
- ▶ Troubles mentaux associés aux 3 formes de violence
- ▶ Troubles OH liés davantage à violence psychique
- ▶ Abus de substances liés davantage à violence physique
- ▶ Troubles mixtes liés aux 3 formes de violence
- ▶ L'abus de substances rends la personne plus vulnérable à la violence.
- ▶ La violence du partenaire augmente le risque de dépression et l'abus de substances
- ▶ Salom C.et all,Substance use and mental health disorders are linked to differente forms of intimate partner violence victimisation, Drug and Alcool dpndence, 2015.,151,121-127
- ▶ Kranen et all, 2014

Facteurs de risque de l'auteur de violences conjugales

- ▶ Troubles psychiques et de la personnalité
 - ▶ Abus d'alcool et drogues
 - ▶ Antécédents de violences agies
 - ▶ Antécédents de violences subies dans l'enfance
 - ▶ Faible niveau scolaire
 - ▶ Précarité socio-économique
- ▶ Heize L. et al, Violence by intimate partner,World repport on violence and health; genève,WHO,2002;87-121

Conséquences psychiques des violences conjugales

- ▶ La dépression est le 1^{er} trouble psychiatrique chez les victimes de violence
 - ▶ Violence conjugales : facteur de risque de dépression avec une prévalence de 35 à 65 %
 - ▶ Evaluer l'existence de violences conjugales dans un contexte de dépression.
 - ▶ Risque élevé de PTSD
- ▶ Réf: Koss M.P. et all,Depression and PTSD in survivors of male violence, Psychol.women,2003;27.130-42
Bonomi et all,partnet violence and women's physical, mental and social functioning. Am.J.Prev med. 2006;30:458-66

Rôle du clinicien

- ▶ Dépistage précoce de problématiques psychiques et d'addiction
- ▶ Dépistage de la violence !
- ▶ Accessibilité aux soins spécifiques
- ▶ Suivi régulier, soutien
- ▶ Travail en réseau et avec les proches
- ▶ Soutien juridique et légale !
- ▶ Connaissance de la législation !