

Annexe 1 : Médicaments sur ordonnance que les optométristes peuvent utiliser sous leur propre responsabilité

Les optométristes qui disposent d'une autorisation de pratiquer sous leur propre responsabilité peuvent utiliser les médicaments de cette liste sans ordonnance médicale.

| Groupe thérapeutique ATC IT | Médicament (substance active) | Indication Méthode d'examen |
|--|---|--|
| Mydriatiques et cycloplégiques S01F 11.02 | Tropicamide 0.5% Gtt. Opht. (Tropicamide) Cyclogyl 0,5% et 1,0% Gtt. Opht. (cyclopentolate) Atropine 0.5% Faure Gtt. Opht. (Atropine) Néosynéphrine-POS 5% (phényléphrine) | Ophthalmoscopie Skiascopie Skiascopie Ophthalmoscopie |
| Anesthésiques locaux S01H 11.03 | Tétracaïne 1% Gtt. Opht. (Tétracaïne) Aicaïne 0.5% Gtt. Opht. (proximethacaine) Oxybuprocaïne 0.4% Gtt. Opht (Oxybuprocaïne) Novesin 0.4% Gtt. Opht. (oxybuprocaïne) | Tonométrie, tonographie Tonométrie, gonioscopie Tonométrie, tonographie, gonioscopie Gonioscopie, tonométrie de contact selon Goldemann |
| Colorants S01JA 14.03 | Fluorescéine 0.5% Gtt. Opht. (Fluorescéine) Fluorescéine Oxybupro Gtt. Opht (Fluorescéine) | Mesure de la pression oculaire par tonométrie d'aplanation Mesure de la pression intraoculaire avec le tonomètre de Goldmann, coloration diagnostique de l'épithélium cornéen |
| Larmes artificielles et autres moyens S01XA20 11.08.20 | Gel ophtalmique Lacri-Vision (acide hyaluronique) Gel contour des yeux Lacrycon (acide hyaluronique) | Réfraction subjective |
| Substances viscoélastiques S01KA 11.08. | Aucune dans la catégorie de remise B Dispositif médical sans substance active Méthocel "®" (hypromellose) | Gonioscopie Examen de la cornée avec un verre de contact miroir |

Médicaments de la catégorie de remise B pour une utilisation diagnostique sous sa propre responsabilité par des titulaires d'un Bachelor of Science en optométrie HES. Si elles sont disponibles, les unités à dose unique doivent être utilisées.